

Инструментальное определение суицидального настроения на комплексе «РОФЭС»-Профессионал



Определяет пресуицидальное состояние на текущее время со среднесрочным прогнозом до 24-х часов.

Алгоритм теста на комплексе «РОФЭС»

Время тестирования 220 секунд (3 минуты 40 секунд).

Зоны инструментального тестирования – кожные зоны на лучезапястных и голеностопных суставах.

<p>1 шаг. Процесс тестирования на комплексе «РОФЭС» - модуль «РОФЭС измерение».</p>	<p>По данным инструментального тестирования определяется электрофизиологический паттерн, соответствующий психоэмоциональному состоянию человека в пресуицидальный период.</p>
<p>2 шаг. Оператор запускает «Автоматизированный анализ» полученных данных (Анализ ЭС);</p>	<p>Автоматическая обработка Экспертной системой программы «РОФЭС» даёт заключение в разделе «Психология» о текущем психоэмоциональном состоянии тестируемого.</p>
<p>3 шаг. Анализ автоматически рассчитанных оценок психоэмоционального состояния</p>	<p>На фоне психоэмоциональных состояний, определяющих портрет тестируемого, у него будет вывод: «Сильно угнетённое, подавленное состояние».</p> <p>В комментарии указано, что данное состояние характерно при суицидальном настрое. Обратить усиленное внимание специалистов для исключения фатального исхода.</p> <p>Вывод рассчитывается с коэффициентом математической вероятности от 0 до 1. Актуальным будет являться коэффициент от 0,65 и выше (подсвечивается розовым цветом).</p> <p>Коэффициент от 0,51 до 0,65 характеризует наличие саморазрушающего поведения, ещё не ставшего</p>

	преобладающим для тестируемого.
Дополнительные автоматические оценки, актуализирующие данный вывод, повышающие его вероятность и увеличивающие время прогноза	<p>Психоэмоциональный статус: «Напряжение компенсаторных сил организма (стрессовое, постстрессовое состояние)» «Дистресс – эмоциональное опустошение»</p> <p>Адаптационный потенциал: меньше 20%</p> <p>Функциональное состояние: «Требуется восстановление»</p>

Дополнительно:	<p>: Методом нарастания среднего, когда будет наблюдаться повторяемость электрофизиологического паттерна «суицидального настроения», определяется долгосрочный прогноз, если с тестируемым не будет проводиться коррекционная психофизиологическая работа. Например, «Методика профилактики утомлённого состояния и повышения стрессоустойчивости с биологической обратной связью (БОС)» - МОНИКОР. , используемая для восстановления и профилактики «Панических атак».</p> <p>Цикл релаксационных сеансов по 40 - 50 минут, с аффирмациями, направленными на эмоциональную стабилизацию.</p>
-----------------------	---

Тенденция нарастания "суицидального потенциала" для групп лиц, подвергшихся воздействию различных полистрессогенных факторов, характеризуется наличием для них общей картины энергетического дисбаланса, отражающегося в виде определённого электрофизиологического паттерна, который возникает в момент обострения жизненных ситуаций, сезонных климатических колебаний, межличностных конфликтов.

Получение оперативной прогностической диагностики психоэмоционального состояния лиц "группы риска" позволяет целенаправленно работать психологам с данным контингентом для своевременного предотвращения суицида.

Все результаты аккумулируются в базе данных за каждым тестируемым.

Методом накопления общего среднего рассчитываются свойства личности, физиологические особенности организма с расчётом «слабого звена» для дальнейших прогнозов психосоматических состояний.

Накопление базы позволяет осуществлять расчёт оценок по психологической совместимости и выведением долгосрочных прогнозов.